

# Dépistage de la rétinopathie diabétique

Écrit par HAS

Lundi, 07 Mars 2011 13:59 -

---



Un dépistage de la rétinopathie diabétique à améliorer

## Dépistage de la rétinopathie diabétique

Écrit par HAS

Lundi, 07 Mars 2011 13:59 -

---

La Haute Autorité de Santé, saisie par la Direction Générale de la Santé, a évalué les différentes techniques et modes d'organisation

du

dépistage de la rétinopathie diabétique.

Selon les estimations, c

ette complication oculaire touche

rait

plus de 200

000 diabétiques

.

Elle

peut entraîner une diminution des capacités de vision

,

voire la cécité si elle n'est pas dépistée et traitée à temps

.

La HAS

émet

ainsi

des

recommandations

de santé publique

pour améliorer le dépistage de la rétinopathie

diabétique

en adaptant ses modalités et en améliorant la coordination des différents intervenants.

Une action coordonnée entre médecin généraliste, diabétologue, ophtalmologiste...

De façon à optimiser la prise en charge du patient, une action coordonnée entre les différents intervenants doit être mise en œuvre et permettre l'échange d'informations relatives au patient.

Le médecin généraliste devra

it

par exemple transmettre à l'ophtalmologiste le taux d'hémoglobine glyquée,

l'existence ou non d'une hypertension ou encore l'ancienneté du diabète. En retour,

## Dépistage de la rétinopathie diabétique

Écrit par HAS

Lundi, 07 Mars 2011 13:59 -

---

l'ophtalmologiste enverra le type d'examen réalisé, le diagnostic, le rythme de dépistage et / ou le délai de consultation préconisé.

Une périodicité du dépistage à adapter selon les patients diabétiques

Jusqu'à maintenant, un dépistage annuel de la rétinopathie diabétique était recommandé. Ce rythme peut

être porté à deux ans chez certains diabétiques

à faible risque de complication oculaire

: ceux qui ne sont pas traités par insuline

,  
dont l'hémoglobine glyquée  
et la pression artérielle sont  
équilibrées

s

,  
et dont

un

premier

examen du fond d'œil

indique

l'absence de rétinopathie

.

En revanche, pour tous les autres diabétiques, un examen annuel du fond d'œil

reste nécessaire.

## Dépistage de la rétinopathie diabétique

Écrit par HAS

Lundi, 07 Mars 2011 13:59 -

---

### Les techniques de dépistage recommandées par la HAS

Le dépistage de la rétinopathie diabétique repose sur l'observation du fond d'œil. Sa réalisation régulière chez les diabétiques doit permettre de détecter suffisamment tôt cette complication

,  
pour  
la traiter et ainsi  
limiter  
les  
troubles  
de  
la  
vision.

La Haute Autorité  
de Santé a évalué les différentes  
modalités  
qui peuvent être utilisées  
pour le dépistage  
de la rétinopathie diabétique  
, et a défini les critères de qualité pour chacune d'  
elles  
:

- la biomicroscopie réalisée par l'ophtalmologiste reste validée par la HAS ;

- la rétinographie couleur est validée par la HAS sous certaines conditions de réalisation (par exemple qualité des clichés  
...)  
;

- le dépistage peut également se faire par une lecture différée des clichés (rétinographies couleur)  
pris par un autre professionnel que l'ophtalmologiste  
. Cette  
modalité

## Dépistage de la rétinopathie diabétique

Écrit par HAS

Lundi, 07 Mars 2011 13:59 -

---

est validée  
pour des populations âgées de moins de 70 ans et  
sous certaines conditions (par exemple qualité de la transmission des images  
ou  
des résultats  
,  
lecture par un ophtalmologiste dans un délai d'une semaine  
maximum  
...).

Une adaptation régionale du dépistage à définir

Les raisons qui sont à l'origine d'une insuffisance du dépistage sont multiples et spécifiques à chaque territoire.

Afin de pouvoir agir sur

le

s nombreux déterminants du

dépistage

insuffisant

,

l'échelon

régional semble le mieux adapté. En effet,

c'est

à cette échelle

qu'il est possible

d'intervenir

sur les

dimensions

socioculturelles

ou de

prendre en compte les

problèmes

d'accès aux soins liés à la démographie médicale des ophtalmologistes ou à des facteurs

## Dépistage de la rétinopathie diabétique

Écrit par HAS

Lundi, 07 Mars 2011 13:59 -

---

économiques. Pour certaines de ces situations, un programme de dépistage par lecture différée de rétinographie

couleur

pourra

constituer

une solution

adaptée

.

Consultez les documents en ligne sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)