



Neuilly-sur-Seine, le 29^{er} juin 2020 – Lors du dernier congrès de diabétologie outre-Atlantique (American Diabetes Association) le laboratoire Eli Lilly and Company a présenté de nouvelles données sur le dulaglutide, agoniste du récepteur du GLP-1 (Glucagon-Like-Peptide-1) hebdomadaire prêt à l'emploi. Les données présentées portent sur les résultats de l'essai clinique AWARD-11 ainsi que des données américaines de persistance du dulaglutide 0,75 et 1,5mg.

Résultats de l'étude Award 11 à 36 semaines

Dans l'essai clinique AWARD-11, l'efficacité et l'efficacité de doses plus élevées de dulaglutide ont été démontrées.

Les doses de 3 et 4,5 mg ont entraîné des diminutions statistiquement supérieures de l'HbA1C par rapport au placebo.

Trulicity (dulaglutide) : De nouvelles données cliniques

Écrit par Didier Poli

Mardi, 30 Juin 2020 14:40 - Mis à jour Mardi, 30 Juin 2020 14:49

Selon l'«ÂÂ efficacy estimandÂÂ » qui prend en compte les patients qui sont restés sous traitement, le

Traitement

Diminution de l'HbA1C(critère principal)

(8,6% à baseline)

Perte de poids

(95,9 kg à baseline)

dulaglutide 4,5mg

-1,9%*

-4,7 kg*

dulaglutide 3mg

Trulicity (dulaglutide) : De nouvelles données cliniques

Écrit par Didier Poli

Mardi, 30 Juin 2020 14:40 - Mis à jour Mardi, 30 Juin 2020 14:49

-1,7%*

-4,0 kg*

dulaglutide 1,5mg

-1,5%

-3,1 kg

* significativité statistique comparativement au dulaglutide 1,5 mg

Selon le «Treatment regimen estimand», chacune des doses a entraîné une diminution de l'HbA1C et une perte de poids significative. Seule la dose de 4,5mg s'est avérée supérieure à la dose de 1,5mg du dulaglutide.

Quelles que soient les modalités statistiques, la majorité des patients inclus dans l'étude ont atteint les objectifs d'HbA1C