Le traitement tiotropium + olodatérol associé à une activité physique et à un programme d'éducation thérapeutique (ETP) augmente signifcativement la capacité à l'exercice des patients atteints de BPCO versus placebo + ETP.[1,2]

L'étude PHYSACTO® a montré une amélioration dans la dyspnée liée à l'activité physique dans le groupe de patients recevant l'association fixe tiotropium + olodatérol (Respimat®) versus placebo. [1]

Même au stade précoce de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), la diminution de l'activité physique est un facteur prédictif aggravant de la maladie et augmente le risque d'handicap et de décès.[3,4]

Bracknell, Royaume-Uni, 5 septembre 2016 - Boehringer Ingelheim a annoncé aujourd'hui les premiers résultats de l'étude de Phase III PHYSACTO® qui montrent que Spiolto® Respimat® (ti otropium+olodatérol), associé à un entrainement physique, aide les personnes atteintes de BPCO à marcher plus longtemps par rapport à celles recevant un placebo.
[1,2]

Tous les participants de l'essai ont été inclus dans un programme d'éducation thérapeutique proposant différents outils, leur permettant de modifier leur comportement, en toute autonomie, afin de les aider à mieux gérer leur maladie.
[1,2,5]

Ces données ont été présentées aujourd'hui lors du Congrès de l'ERS 2016 à Londres.

Après 8 semaines, chez les patients atteints de BPCO, de stade modéré à sévère, traités par l'association tiotropium+olodatérol associée à une activité physique, la capacité à faire de l'exercice a significativement augmenté de 45,8 % (p