Paris, le 18 mai 2020. Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19 et la mise sous confinement des populations
, un certain nombre de patients insuffisants cardiaques ne se sont pas rendus à leur consultation
chez
leur
médecin traitant et/ou
cardiologue par peur
de contamination
au Covid-19, de surcharger l
es services réorganisés autour du Covid-19 ou tout simplement de déranger les soignants.
Par conséquence
,
il a été constaté
une baisse
importante du nombre de consultations
dans les services de cardiologie.

Dans ce contexte, le Groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathies (GICC) de la Société Française de Cardiologie lance une enquête
auprès des malades
pour mieux comprendre et évaluer les effets du confinement su
r les patients insuffisants cardiaques, notamment le ressenti de la maladie, son évolution et sa prise en charge. L
'
étude en ligne est disponible sur le lien
suivant :
https://url
z
.fr/clPz

« Depuis plusieurs années, le GICC et la SFC se mobilisent pour sensibiliser le grand public, les patients et les prof essionnels de santé afin d'

améliorer le dépistage des insuffisants cardiaques et leur prise en charge
.
Aujourd
'
hui, nous avons des indicateurs qui nous laissent penser que cette perturbation
importante peut
générer d
'
autres
conséquences.
Cette
étude nous p
ermettra de mieux cerner l
'
état et la prise en charge de nos patients
»
précise
le
P
rofesseur
Nicolas Lamblin,
Chef de service Urgences et
S
oins intensifs de cardiolo
gie, CH
R
U de Lille et
Président du
c.

Les patients souffrant d'insuffisance cardiaque sont des patients dits « à risque » et nécessiten
t une
thérapeutique a
daptée
, un
suivi régu
lier et
une bonne in
formation éducative des patients et de leurs proches

.
La prévalence de l
'
insuffisance cardiaque est estimée à
2,3 % dans la population adulte et à 1,8 % dans l
'
ensemble de la populatio
n française (soit environ 1 130
000 personnes) selon
la Haute Autorité d
e Santé
[1]
. Chaque année
, l
'
insuffisance cardiaque entraîne plus de 200 000 hospitalisations et cause le décès
de 70 000 personnes.