Sur la semaine écoulée, l'activité des associations SOS Médecins est en baisse, tous âges confondus, au plan national et dans les régions (-17 %, -11 471 consultations). Cette activité est comparable à celle de 2013 pour la même période.

Principaux diagnostics par classe d'âge

Sur la semaine écoulée, parmi les principales pathologies reportées, chez les moins de 15 ans, on note : une augmentation des gastro-entérites, une diminution des infections ORL (rhinopharyngite, angine, otite, laryngite) et des pathologies respiratoires (infection respiratoire aiguë, bronchite). Chez les adultes de 15 ans et plus, les infections ORL (rhinopharyngite, angine), les infections respiratoires (bronchite, infection respiratoire aiguë, grippe) et la gastro-entérite sont en baisse.

Evolution des indicateurs saisonniers

Sur la semaine écoulée, les indicateurs saisonniers sont stables ou en baisse tous âges confondus à des niveaux inférieurs ou comparables à 2013.

L'indicateur de **gastro-entérite** est stable, tous âges confondus, sur la période. L'activité en lien avec cet indicateur est inférieure à 2013. Chez les moins de 15 ans, on note une augmentation de 19 % (+328 cas), chez les plus de 15 ans, les diagnostics sont en baisse de 15 % (-621 cas).

L'indicateur de **grippe/syndrome grippal** est en baisse tous âges confondus (-14 %, -243 cas). L'activité est nettement inférieure à 2013 sur la même période. On observe toutefois une augmentation chez les 5-14 ans (+23 %, +32 cas).

Chez les moins de 2 ans, la **bronchiolite** est en baisse (-57 %, -305 cas). L'activité est comparable à celle de 2012 et de 2013.

L'indicateur de **bronchite** est en baisse tous âges confondus et pour les classes d'âge surveillées (-40 %, -1 607 cas). L'activité est comparable à celle de 2013.

Les diagnostics de **pneumopathies** sont en baisse tous âges confondus et pour les classes d'âge surveillées (-29 %, -193 cas). L'activité est comparable à celle de 2013.

Les diagnostics de **crise d'asthme** sont en baisse tous âges confondus et pour les classes d'âge surveillées (-29 %, -223 cas).