La Haute Autorité de Santé précise la prise en charge échocardiographique des personnes exposées au benfluorex

L'échocardiographie Doppler transthoracique est indiquée dans le cadre du suivi des patients exposés au x produi ts contenant du benfluorex - Mediator et ses génériques . S aisie par l e Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé , l a Haute Autorité de Santé publie une fiche de bon usage sur cet examen , à destination des professionnels de santé sollicités par des personnes exposées au benfluorex .

En cas de suspicion clinique, de doute d'atteinte valvulaire ou sur demande des personnes exposées au benfluorex , une écho

cardio
graphie
Doppler transthoracique
sera
réalisée
en consultation spécialisée de cardiologie
pour caractériser la présence d'une fuite valvulaire.
Pour déployer
leurs
recommandations, l'A
gence
f
rançaise de
sécurité sanitaire
des
p
roduits de
s
anté
et
la Direction
générale de la santé ont diffusé, l
e 28 février dernier,
une information à l'ensemble d
es
cardiologues
sur l
a prise en charge médicale des
personnes exposées au
benfluor
ex et
présentant
donc
un risque de valvulop
at
hie
ou d'hypertension artérielle pulmonaire.

Dans la continuité de cette information, la Haute Autorité de Santé diffuse aujourd'hui les modalités de suivi par
échocardiographie Doppler transthoracique
dans une fiche de bon usage et a mis à jour son rapport d'évaluation
de
2009
sur
cet examen. Ces documents doivent permettre d'apporter aux
cardiologues
une information homogène, pratique et pédagogique
et
constituent également un complément d'information pour les
autres
médecins
, dont les médecins
traitants qui prescrivent cet examen
et voient en consultation des p
ersonnes
exposé
e
s inqui
è
t
e
s
.

Les documents publiés aujourd'hui et diffusés notamment aux cardiologues via le Conseil National Professionnel de Cardiologie p
récisent
les signes
écho
cardio
graphiques à rechercher

pour établir le diagnostic de valvulopathie. Ils déterminent également
la fréquence de suivi de la pathologie.
Cette fiche sera diffusée aux autres professionnels impliqu
és dans la prise en charge de
s personnes
exposées au benfluorex
(médecin généraliste, endocrinologue, pneumologue...).

Pour consulter les documents sur l'échocardiographie Doppler transthoracique dans le suivi des personnes exposées au benfluorex
,
cliquez ici
.