

NS-Park/F-CRIN annonce les premiers résultats de l'étude PREDI-STIM 2023, une année charnière

Alors que l'étude PREDI-STIM destinée à prédire la balance risque/bénéfice des patients à la

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative chronique. La stimulation cérébrale profonde (SCP) est une technique chirurgicale qui consiste à insérer des électrodes dans le noyau subthalamique (STN) du cerveau pour stimuler les cellules nerveuses.

Contre-indiquée pour les patients trop âgés (plus de 70-75 ans) ou à risques de développer des troubles du comportement.

1. Sur les troubles du comportement en sommeil paradoxal : présence de troubles du sommeil paradoxal (TSP) avant la chirurgie.

2. Sur les traits de personnalité : « L'efficacité de la chirurgie a été évaluée par une équipe de chercheurs de l'Université de Bordeaux.

3. Sur les aspects intellectuels et cognitifs : une équipe de chercheurs de l'Université de Bordeaux a évalué l'impact de la chirurgie sur les aspects intellectuels et cognitifs des patients.

4. Sur l'hypomanie : « Certains patients parkinsoniens développent une hypomanie après la chirurgie.

5. Sur les troubles de la parole : l'étude vise à déterminer si la chirurgie peut améliorer les troubles de la parole chez les patients parkinsoniens.

De nouveaux résultats sont attendus d'ici 1 an et les résultats définitifs d'ici 5 ans. D'autres résultats su

- Créée en 2012, portée par l'INSERM et financée par l'ANR et le ministère de la Santé, F-CRIN (French